

Forme Equivalente à la Condition Δ_2 et Certains résultats de séparations dans les Espaces Modulaires

Par
A.Hajji

Abstract. In this paper, we present an equivalent form of the Δ_2 -condition which allow us to redefine the topological vector space structure of a modular spaces using the filter base. We show also the characterization of closed subsets (in the sens of this topology) of a modular spaces which permit us to establish some separation results in modular spaces.

Keywords. Modular spaces.

A.M.S Subject Classifications: 46A80.

1 Introduction

La condition Δ_2 joue un rôle primordial dans la théorie des espaces modulaires. J.Musielak [5] a montré qu' une base modulaire est topologique si et seulement si le modulaire ρ vérifie la condition Δ_2 , et en appliquant, pour un espace modulaire X_ρ avec le modulaire ρ , deux formes équivalentes à la condition Δ_2

- (1) Pour toute suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans X_ρ si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \rho(x_n) = 0$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \rho(2x_n) = 0$.
- (2) Pour tout $u \in \mathcal{B}$ il existe $v \in \mathcal{B}$ tel que $2v \in u$,

où $\mathcal{B}$ est la famille de ρ -boules $B_\rho(0, r) = \{x \in X_\rho : \rho(x) < r\}$ pour $r > 0$. La forme (1) de la condition Δ_2 est étroitement liée avec l'espace modulaire X_ρ , la forme (2) de la condition Δ_2 se réfère à la topologie (à base $\mathcal{B}$) introduite dans X_ρ .

En général, la ρ -convergence (convergence au sens de ρ : pour toute suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans X_ρ , $x_n \xrightarrow{\rho} x$ est équivalent qu'il existe $\lambda > 0$ tel que la suite $(\rho(\lambda(x_n - x)))_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers zéro) n 'implique pas la convergence en norme, tandis que si ρ est convexe et vérifie la condition Δ_2 , alors ces deux modes de convergences sont équivalents (voir [3], [4]) et [5]).

Nous présentons dans ce papier, la suivante forme équivalente à la condition Δ_2 (voir le Lemme 1.1)

(3) Pour tout $\epsilon > 0$, il existe $L > 0$, et il existe $\delta > 0$ tels que si $\rho(x) < L$ et $\rho(x - y) < \delta$ alors $|\rho(y) - \rho(x)| < \epsilon$.

C'est à dire que le modulaire ρ possède la propriété d'une " certaine" continuité uniforme local. La forme (3) de la condition Δ_2 , nous permet de redéfinir, à l' aide d'une base de filtres (voir [2]), la structure d'espace vectoriel topologique de l'espace modulaire X_ρ et de munir l'espace modulaire X_ρ d'une topologie séparée notée τ , cette dernière propriété pour la topologie τ n'a pas été mentionnée dans [5]. Aussi la forme (3) de la condition Δ_2 est fréquemment utiliser pour caracteriser les ensembles fermés au sens de la topologie τ , ce qui donne la démonstration de la définition 5.4 [5] des ensembles ρ -fermés dans l'espaces modulaire X_ρ , et pour montrer certains résultats de séparations dans l'espace modulaire X_ρ .

Nous commençons par un rappel sur les notions de base de la théorie des espaces modulaires (voir [5]).

Définition 1.1 Soit X un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

a) La fonctionnelle $\rho : X \longrightarrow [0, +\infty]$ est dite un modulaire si pour tout $x, y \in X$ on a:

i) $\rho(x) = 0$ si et seulement si $x = 0$.

ii) $\rho(-x) = \rho(x)$ dans le cas réel

et $\rho(e^{it}x) = \rho(x)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$ dans le cas complexe.

iii) $\rho(\alpha x + \beta y) \leq \rho(x) + \rho(y)$ pour $\alpha, \beta \geq 0$, $\alpha + \beta = 1$, $\forall x, y \in X$.

b) L'espace modulaire X_ρ associé au modulaire ρ est donné par:

$$X_\rho = \{x \in X / \rho(\lambda x) \rightarrow 0 \text{ quand } \lambda \rightarrow 0\}.$$

Remarques

1) Si on remplace iii) par iii'):

$$\rho(\alpha x + \beta y) \leq \alpha^s \rho(x) + \beta^s \rho(y)$$

pour $\alpha, \beta \geq 0$, $\alpha^s + \beta^s = 1$ avec un $s \in]0, 1]$, alors le modulaire ρ est dit un s-convexe.

Un modulaire 1-convexe est dit convexe.

2) Si ρ est un modulaire convexe alors l'espace modulaire X_ρ sera équipé de la norme de Luxemburg définie par:

$$\|x\|_\rho = \inf\{u > 0, \rho(\frac{x}{u}) \leq 1\}$$

Où par la norme (voir [1]), où ρ est supposé convexe, définie par:

$$\|f\| = \frac{\xi}{s(f)},$$

où $\xi > 0$ un nombre reel, $f \in L^\psi$ et $s(f) = \sup\{s : \rho(sf) \leq \xi\} > 0$.

Par conséquent, si ρ n'est pas convexe alors on ne peut pas conclure que X_ρ est un espace normé.

3) Si ρ vérifie la forme (1) de la condition Δ_2 , alors on a l'équivalence suivante:

$$x_n \rightarrow x \iff x_n \xrightarrow{\rho} x,$$

où $x_n \rightarrow x$ veut dire $\lim_{n \rightarrow +\infty} \rho(x_n - x) = 0$. En effet:

Soit $x_n \xrightarrow{\rho} x$ alors il existe $\lambda > 0$ tel que la suite $(\rho(\lambda(x_n - x)))_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers zéro.

Si $\lambda \geq 1$ alors on aura: $\rho(x_n - x) \leq \rho(\lambda(x_n - x))$ et ceci montre que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \rho(x_n - x) = 0$.

Si $\lambda < 1$ alors il existe tout jour $p \in \mathbb{N}$ ($\mathbb{N}$: l'ensemble des entiers naturels) tel que $1 \leq 2^p \lambda$ et on aura $\rho(x_n - x) \leq \rho(2^p \lambda(x_n - x))$, or par la forme (1) de la condition Δ_2 on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \rho(2^p \lambda(x_n - x)) = 0$, ce qui montre que $x_n \xrightarrow{\rho} x$ implique $\lim_{n \rightarrow +\infty} \rho(x_n - x) = 0$. Inversement.

Soit $x_n \rightarrow x$ veut dire il existe $\lambda = 1$ tel que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \rho(x_n - x) = 0$. D'où $x_n \xrightarrow{\rho} x$, finalement on peut conclure que si ρ vérifie la forme (1) de la condition Δ_2 , alors $x_n \rightarrow x \iff x_n \xrightarrow{\rho} x$

Rappelons que nous ne pouvons appliquer la forme (1) de la condition Δ_2 que pour les suites. Dans le résultat suivant nous montrons une forme équivalente de la condition Δ_2 qui est une sorte de continuité uniforme local de ρ et qui sera fréquemment utilisée par la suite.

On dit que ρ vérifie la propriété de Fatou si $x_n \xrightarrow{\rho} x$ et $y_n \xrightarrow{\rho} y$, alors $\rho(x - y) \leq \liminf \rho(x_n - y_n)$.

Lemme 1.1 Soit ρ un modulaire de X_ρ on a:

ρ vérifie la condition Δ_2 si et seulement si pour tout $\epsilon > 0$, ils existent $L > 0$ et $\delta > 0$ tels que si $\rho(x) < L$ et $\rho(x - y) < \delta$, alors $|\rho(y) - \rho(x)| < \epsilon$.

Preuve du Lemme 1.1.

$\Leftarrow$) Soit la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans X_ρ tel que $\rho(x_n) \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$. Ceci impliquera que pour tout $\epsilon > 0$, il existe n_0 tel que pour $n > n_0$ on a:

$$\rho(x_n) < \inf(L, \delta, \frac{\epsilon}{2}).$$

On pose $X_n = x_n$ et $Y_n = 2x_n$, pour $n > n_0$ on a:

$$\rho(X_n) = \rho(x_n) = \rho(Y_n - X_n) < \inf(L, \delta, \frac{\epsilon}{2}),$$

donc $\rho(Y_n) = \rho(2x_n) \leq \frac{\epsilon}{2} + \rho(x_n) \leq \epsilon$ dès que $n > n_0$.

D'où la suite $(\rho(2x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers zéro quand n tend vers $+\infty$. Par suite ρ vérifie la condition Δ_2 .

$\Rightarrow$) Soit ρ un modulaire qui vérifie la condition Δ_2 .

Supposons qu'il existe $\alpha > 0$ tels que pour tout $L > 0$ et tout $\delta > 0$, il existe x, y vérifiant $\rho(x) < L, \rho(x - y) < \delta$ et $|\rho(y) - \rho(x)| \geq \alpha$.

Posons $L = \delta = \frac{1}{n}$ alors il existe x_n, y_n tels que

$$\rho(x_n) < \frac{1}{n}, \rho(y_n - x_n) < \frac{1}{n} \text{ et } |\rho(y_n) - \rho(x_n)| \geq \alpha,$$

ce qui entraîne que $\rho(x_n) \longrightarrow 0$ et $\rho(y_n - x_n) \longrightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.

Or

$$\rho(y_n) = \rho((x_n - y_n) + y_n) \leq \rho(2(x_n - y_n)) + \rho(2x_n),$$

et comme ρ vérifie la condition Δ_2 , alors $\rho(y_n) \longrightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$, donc

$$|\rho(y_n) - \rho(x_n)| \longrightarrow 0 \text{ quand } n \rightarrow +\infty,$$

absurde car $|\rho(y_n) - \rho(x_n)| \geq \alpha > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. D'où

$\forall \epsilon > 0, \exists L > 0, \exists \delta > 0$, tels que si $\rho(x) < \delta$ et $\rho(y - x) < \delta$, alors $|\rho(y) - \rho(x)| < \epsilon$.

Ce qui termine la preuve du Lemme 1.1.

2 Structure d'espace vectoriel topologique séparé d'un espace modulaire.

On considère l'espace modulaire X_ρ où ρ est un modulaire vérifiant la condition Δ_2 . Soit la famille $\mathcal{B} = \{B_\rho(0, r) / r > 0\}$ où $B_\rho(0, r) = \{x \in X_\rho / \rho(x) < r\}$.

Proposition 2.1 1) la famille $\mathcal{B}$ est une base de filtres.

2) Tout élément de $\mathcal{B}$ est équilibré, absorbant et si de plus ρ est un convexe alors tout élément de $\mathcal{B}$ est convexe.

Preuve de la proposition 2.1.

1) $\mathcal{B}$ est une base de filtres. En effet:

a) $\emptyset \notin \mathcal{B}$ car tout $B_\rho(0, r)$ contient son centre.

b) Soient $B_\rho(0, r_1)$ et $B_\rho(0, r_2)$ dans $\mathcal{B}$, posons $r = \inf(r_1, r_2)$, on obtient

$$B_\rho(0, r) \subset B_\rho(0, r_1) \cap B_\rho(0, r_2).$$

En effet, pour $z \in B_\rho(0, r)$ on a:

$$\begin{cases} \rho(z) < r \leq r_1 \\ \rho(z) < r \leq r_2 \end{cases}$$

donc $z \in B_\rho(0, r_1) \cap B_\rho(0, r_2)$.

Par suite il existe $B_\rho(0, r) \in \mathcal{B}$ tel que $B_\rho(0, r) \subset B_\rho(0, r_1) \cap B_\rho(0, r_2)$. D'où $\mathcal{B}$ est une base de filtres.

2) Soit $B_\rho(0, r) \in \mathcal{B}$.

i) $B_\rho(0, r)$ est équilibré. En effet:

Soit $\alpha \in \mathcal{T}$ tel que $\lambda = |\alpha| \leq 1$, alors il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $\alpha = \lambda e^{i\theta}$, prenons $x \in B_\rho(0, r)$ on a:

$$\rho(\alpha x) = \rho(\lambda e^{i\theta} x) = \rho(\lambda x) \leq \rho(x) < r,$$

ceci impliquera que $\alpha x \in B_\rho(0, r)$.

ii) $B_\rho(0, r)$ est absorbant. En effet:

Soit $x \in X_\rho$ donc $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \rho(\lambda x) = 0$ ce qui est équivalent à $\forall r > 0, \exists \delta > 0$, tel que $0 < \lambda < \delta$ on a $\rho(\lambda x) < r$, donc il existe $\lambda > 0$ tel que $\lambda x \in B_\rho(0, r)$ ce qui montre que $B_\rho(0, r)$ est absorbant.

Si maintenant ρ est convexe, soient $B_\rho(0, r) \in \mathcal{B}$, $x, y \in B_\rho(0, r)$ et $\lambda \in [0, 1]$ on a:

$$\rho(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda \rho(x) + (1 - \lambda)\rho(y) < r,$$

donc

$$\lambda x + (1 - \lambda)y \in B_\rho(0, r).$$

D'où $B_\rho(0, r)$ est convexe.

Théorème 2.1 *Supposons que le modulaire ρ vérifie la condition Δ_2 . Alors X_ρ est un espace vectoriel topologique séparé.*

Remarque.

Rappelons que si ρ vérifie la condition Δ_2 , J.Musielak a montré dans [5] que X_ρ est un espace vectoriel topologique sans mentionné la séparation de la topologie.

Nous cherchons grâce à la forme (3) de la condition Δ_2 une autre démarche (la topologie définit par une base de filtres) de montrer ce théorème en précisant que la topologie est séparée. D'où l'intérêt de la forme (3) de la condition Δ_2 .

Preuve du Théorème 2.1.

La démonstration est basée sur le Lemme 1.1 et la Proposition 2.1.

D'après la Proposition 2.1, la famille $\mathcal{B}$ est une base de filtres, de plus tout élément de $\mathcal{B}$

est équilibré et absorbant.

D'autre part, pour tout $B_\rho(0, r)$, il existe $\delta_0 > 0$ tel que

$$B_\rho(0, \delta_0) + B_\rho(0, \delta_0) \subset B_\rho(0, r).$$

En effet, soit $r > \epsilon > 0$, comme ρ vérifie la condition Δ_2 , donc $\exists L > 0, \exists \delta > 0$, tel que si $\rho(x) < L$, $\rho(x - y) < \delta$ alors $|\rho(y) - \rho(x)| < \epsilon$ (voir le Lemme 1.1).

Posons

$$\delta_0 = \inf(r - \epsilon, L, \delta)$$

et soit

$z \in B_\rho(0, \delta_0) + B_\rho(0, \delta_0)$ donc $z = x + y$ avec

$$\begin{cases} \rho(x) < \delta_0 \\ \rho(y) < \delta_0. \end{cases}$$

On a: $y = z - x \in B_\rho(0, \delta_0)$ implique $\rho(z - x) < \delta_0 \leq \delta$ et $\rho(x) < \delta_0 \leq L$, d'où

$$\rho(z) < \epsilon + \rho(x) < \epsilon + \delta_0 \leq \epsilon + r - \epsilon = r.$$

Ce qui montre que $z \in B_\rho(0, r)$. Par suite $B_\rho(0, \delta_0) + B_\rho(0, \delta_0) \subset B_\rho(0, r)$.

Par conséquent X_ρ est un espace vectoriel topologique. La topologie est définie par:

$$\mathcal{T} = \{G \neq \emptyset, G \subset X_\rho / \text{ si } x \in G, \text{ alors } \exists V \in \mathcal{B} \text{ tel que } x + V \subset G\} \cup \{\emptyset\}.$$

Il est facile de vérifier que $\mathcal{T}$ est une topologie de X_ρ . Il reste à montrer que $(X_\rho, \mathcal{T})$ est séparé. Pour cela, soient x, y dans X_ρ tel que $x \neq y$.

Supposons que pour tout V_x voisinage de x et V_y voisinage de y on a: $V_x \cap V_y \neq \emptyset$.

Prenons $z \in (x + B_\rho(0, \frac{1}{n})) \cap (y + B_\rho(0, \frac{1}{n}))$, $n \in \mathbb{N}^*$. On a:

$$\begin{cases} \rho(x - z) < \frac{1}{n} \\ \rho(y - z) < \frac{1}{n}. \end{cases}$$

Comme ρ vérifie la condition Δ_2 , alors d'après le Lemme 1.1, pour tout $\epsilon > 0$, ils existent $L > 0$ et $\delta > 0$, tels que si $\rho(x) < L$ et $\rho(y - x) < \delta$ alors $|\rho(y) - \rho(x)| < \frac{\epsilon}{2}$.

On pose $Y = y - x$ et $X = z - x$. Alors on a:

$$\begin{cases} \rho(X) = \rho(x - z) < \frac{1}{n} \\ \rho(Y - X) = \rho(y - z) < \frac{1}{n}. \end{cases}$$

Pour n assez grand tel que $\frac{1}{n} \leq \inf(L, \delta, \frac{\epsilon}{2})$, et par le Lemme 1.1 on a:

$$\rho(Y) = \rho(y - x) < \rho(z - x) + \frac{\epsilon}{2} \leq \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

Donc pour tout $\epsilon > 0$, on a: $\rho(y - x) < \epsilon$, ce qui montre que $\rho(x - y) = 0$, d'où $x = y$ ce qui contredit le fait que $x \neq y$, par suite il existe un voisinage V_x de x et un voisinage V_y de y tel que $V_x \cap V_y = \emptyset$.

Remarque.

Si de plus le modulaire ρ est convexe alors X_ρ est un espace vectoriel topologique localement convexe. En effet:

D'après le Théorème 2.1, X_ρ est un espace vectoriel topologique séparé, et d'après la Proposition 2.1 (2) tout élément de $\mathcal{B}$ est convexe, d'où X_ρ est un espace vectoriel topologique localement convexe séparé.

3 Caractérisation des τ -fermés de l'espace X_ρ .

Rappelons que dans la théorie des espaces modulaires, on trouve les séquentiellement fermés voir par exemple page 19 de [5]. Dans ce travail, nous présentons la définition et la caractérisation des τ -fermés de l'espace X_ρ .

Définition 3.1 Soient ρ un modulaire vérifiant la condition Δ_2 et $F \subset X_\rho$, on dit que F est un fermé pour la topologie τ (τ -fermé) si et seulement si son complémentaire dans X_ρ , qu'on notera C^F , est un ouvert pour la topologie τ .

Théorème 3.1 Soient ρ un modulaire vérifiant la condition Δ_2 et $F \subset X_\rho$, alors on a: F est un fermé au sens de la topologie τ si et seulement si pour toute suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset F$ tel que $x_n \xrightarrow{\rho} x$, alors $x \in F$.

Pour montrer le Théorème 3.1 nous avons besoin de la proposition suivante.

Proposition 3.1 Soient ρ un modulaire vérifiant la condition Δ_2 et F un fermé au sens de la topologie τ dans X_ρ , alors

$$x \in F \iff \forall \epsilon > 0, B_\rho(x, \epsilon) \cap F \neq \emptyset$$

Preuve de la proposition.

Soit $x \in X_\rho$,

$$\begin{aligned} x \notin F &\iff x \in C^F \text{ qui est un ouvert pour la topologie } \tau \\ &\iff \exists B_\rho(0, \epsilon) \in \mathcal{B} / x + B_\rho(0, \epsilon) = B_\rho(x, \epsilon) \subset C^F \\ &\iff \exists \epsilon > 0, \text{ tel que } B_\rho(x, \epsilon) \cap F = \emptyset \end{aligned}$$

D'où $x \in F \iff \forall \epsilon > 0, B_\rho(x, \epsilon) \cap F \neq \emptyset$.

Preuve du Théorème 3.1.

Soient F un fermé pour la topologie τ et $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite dans F tel que $x_n \xrightarrow{\rho} x$ alors pour tout $\epsilon > 0$, il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que si $n > n_0$, on a $x_n \in B(x, \epsilon)$, ceci impliquera que

$$\forall \epsilon > 0, B(x, \epsilon) \cap F \neq \emptyset,$$

d'où d'après la Proposition 3.1, $x \in F$.

Inversement, supposons que F n'est pas un fermé pour la topologie τ , donc C^F n'est pas un ouvert pour la topologie τ , ce qui entraîne qu'il existe $x \in C^F$ tel que pour tout $\epsilon > 0$, $B_\rho(x, \epsilon) \not\subset C^F$ d'où, il existe $x \in C^F$ tel que pour tout $\epsilon > 0$, $B(x, \epsilon) \cap F \neq \emptyset$. Donc,

pour $\epsilon = 1$ il existe $x_1 \in B_\rho(x, 1) \cap F$

pour $\epsilon = \frac{1}{2}$ il existe $x_2 \in B_\rho(x, \frac{1}{2}) \cap F$

...

pour $\epsilon = \frac{1}{n}$ il existe $x_n \in B_\rho(x, \frac{1}{n}) \cap F$.

On obtient donc la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset F$ tel que $x_n \xrightarrow{\rho} x$, alors $x \in F$, contradiction car $x \in C^F$. D'où F est un fermé pour la topologie τ .

4 Certains résultats de séparations dans les espaces modulaires.

Considérons ρ un modulaire vérifiant la condition Δ_2 et soit A un sous-ensemble de X_ρ , on pose par définition pour tout $x \in X_\rho$,

$$\rho(x, A) = \inf\{\rho(x - y), y \in A\}.$$

Nous présentons un résultat de séparation dans les espaces modulaires.

Théorème 4.1 *Soient ρ un modulaire vérifiant la condition Δ_2 , A une partie fermée de X_ρ et $x_0 \notin A$. Alors il existe un voisinage ouvert V_{x_0} de x_0 tel que $V_{x_0} \cap A = \emptyset$.*

Pour montrer le Théorème 4.1, nous avons besoin du résultat suivant.

Proposition 4.1 *Soient ρ un modulaire vérifiant la condition Δ_2 et $A \subset X_\rho$ on a: $\rho(x, A) = 0$ si et seulement si $x \in \overline{A}^\rho$, où $\overline{A}^\rho$ est la fermeture de A pour la topologie τ .*

Preuve.

On a:

$$\rho(x, A) = \inf\{\rho(x - y), y \in A\} = 0,$$

donc pour tout $\epsilon = \frac{1}{n}$, il existe $y_n \in A$ tel que $\rho(x - y_n) < \frac{1}{n}$ ce qui montre qu'il existe une suite $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset A$ tel que $y_n \xrightarrow{\rho} x$ d'où $x \in \overline{A}^\rho$.

Inversement, soit $x \in \overline{A}^\rho$, on a d'après le Théorème 3.1, il existe une suite $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset A$ tel que $y_n \xrightarrow{\rho} x$, donc pour tout $\epsilon > 0$ il existe n_0 , pour $n > n_0$ on a:

$$\rho(x, A) \leq \rho(x - y_n) < \epsilon.$$

D'où

$$\rho(x, A) = 0.$$

Preuve du Théorème 4.1.

On a d'après la Proposition 4.1, $x_0 \notin A$ si seulement si $\rho(x_0, A) = r > 0$.

Comme ρ vérifie la condition Δ_2 alors d'après le Lemme 1.1, pour $\epsilon = \frac{r}{3} > 0$, ils existent $L > 0, \delta > 0$ si $\rho(x) < L$ et $\rho(y - x) < \delta$ alors $|\rho(y) - \rho(x)| < \epsilon$.

De plus il existe un $m_0 \in \mathbb{N}^*$ tel que $\frac{r}{m} < \inf(L, \delta)$ dès que $m > m_0$, on choisit $m_1 \geq \max(3, m_0)$ et on considère le voisinage ouvert de x_0 :

$$V_{x_0} = x_0 + B_\rho(0, \frac{r}{m_1}).$$

Supposons qu'il existe $y \in V_{x_0} \cap A$, comme A est fermé d'après la Proposition 4.1, il existe une suite $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset A$ tel que $y_n \xrightarrow{\rho} y$.

Posons $X_n = y - y_n$ et $Y_n = x_0 - y_n$ comme $y_n \in A$ et $x_0 \notin A$ alors $\rho(Y_n) \geq r$.

D'autre part,

$$\rho(X_n) = \rho(y - y_n) < \frac{r}{m_1} < \inf(L, \delta),$$

dès que $n > n_0$ et

$$\rho(X_n - Y_n) = \rho(x_0 - y) < \frac{r}{m_1} < \inf(L, \delta),$$

d'où $r \leq \rho(Y_n) < \rho(y - y_n) + \epsilon \leq \frac{r}{m_1} + \frac{r}{3} \leq \frac{2r}{3}$ dès que $n > n_0$ absurde donc $V_{x_0} \cap A = \emptyset$.

Remarque.

Si de plus ρ vérifie la propriété de Fatou on aura:

$\overline{B(0, r)} = \overline{B_\rho(0, r)} = \{x \in X_\rho / \rho(x) \leq r\}$ est une boule fermée pour la topologie τ . Toute boule fermée de centre x et de rayon r sera notée $B_f(x, r)$ (voir [4]).

Corollaire 4.1 *Sous les mêmes hypothèses du théorème précédent et si de plus ρ vérifie la propriété de Fatou alors $\overline{V_{x_0}}^\rho \cap A = \emptyset$.*

Preuve.

D'après le Théorème 4.1, il existe $V_{x_0} = x_0 + B_\rho(0, \frac{r}{m_1})$ tel que $V_{x_0} \cap A = \emptyset$.

D'abord on montre que $\overline{V_{x_0}}^\rho = x_0 + B_f(0, \frac{r}{m_1})$. En effet:

Soit $y \in \overline{V_{x_0}}^\rho$ alors d'après la Proposition 4.1, il existe une suite $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset B_f(0, \frac{r}{m_1})$ tel que

$$x_0 + y_n \xrightarrow{\rho} y,$$

ceci impliquera que $y_n \xrightarrow{\rho} y - x_0$. En effet: soient

$$Y_n = y_n - (y - x_0) \text{ et } X_n = 2(y_n - (y - x_0)),$$

il est facile de voir que $Y_n \xrightarrow{\rho} 0$ et comme ρ vérifie la condition Δ_2 alors $X_n \xrightarrow{\rho} 0$.

D'où pour $\epsilon > 0, \exists L > 0, \exists \delta > 0$ tels que

$$\rho(X_n) < \inf(L, \delta, \frac{\epsilon}{2}),$$

et

$$\rho(Y_n - X_n) = \rho(Y_n) < \inf(L, \delta, \frac{\epsilon}{2}),$$

dès que $n \geq n_0$, donc

$$\rho(Y_n) = \rho(y_n - (y - x_0)) < \inf(L, \delta, \frac{\epsilon}{2}) + \frac{\epsilon}{2} \leq \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon,$$

dès que $n \geq n_0$, par suite

$$y_n \xrightarrow{\rho} y - x_0 \in \overline{B_\rho(0, \frac{r}{m_1})}^\rho = B_f(0, \frac{r}{m_1}),$$

donc

$$y = x_0 + (y - x_0) \in x_0 + B_f(0, \frac{r}{m_1}),$$

d'où

$$\overline{V_{x_0}}^\rho \subset x_0 + B_f(0, \frac{r}{m_1}).$$

Inversement, soit

$$x_0 + y \in x_0 + B_f(0, \frac{r}{m_1}),$$

d'après la Proposition 4.1, il existe $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset B_\rho(0, \frac{r}{m_1})$ tel que $y_n \xrightarrow{\rho} y$ et on a aussi la suite $(x_0 + y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset V_{x_0}$ vérifiant $x_0 + y_n \xrightarrow{\rho} x_0 + y$ d'où

$$x_0 + y \in \overline{V_{x_0}}^\rho.$$

Pour terminer, on suit les mêmes démarches de la preuve du Théorème 4.1, on aura:

$$\overline{V_{x_0}}^\rho \cap A = \emptyset.$$

Théorème 4.2 *Soit ρ un modulaire convexe vérifiant la condition Δ_2 . Alors l'espace modulaire X_ρ est normal.*

Preuve du Théorème 4.2.

Le modulaire ρ est convexe et vérifie la condition Δ_2 , alors les convergences au sens du modulaire et au sens de la norme sont équivalentes, donc l'espace modulaire X_ρ est matrisable, alors X_ρ est normal.

References

- [1] Aksoy, A.G-Baillon,J.B. Measures of Non-Compactness in Orlicz Modular Spaces. Collectanea Mathematica Vol 44 (1993).
- [2] Dugundji,J. Topology, Allyn and Bacon, Inc, (1976).
- [3] Khamsi, M.A. Nonlinear Semigroups in Modular Function Spaces. Thèse d'état. Département de Mathématiques, Rabat (1994).
- [4] Khamsi,M.A-Kozłowski,W.M-Reich,S. Fixed point theory in modular function spaces. Nonlinear Analysis, theory, methods and applications, Vol. 14, N^0 11 (1990). 935-953.
- [5] Musielak.J. Orlicz spaces and modular spaces. L.N vol. 1034, S.P. (1983).

Adresse: Département de Mathématiques et Informatique.
Fac. des Sc. Univ. Mohammed V-Agdal
B.P 1014, Rabat, Maroc.

E-mail: hajid32@yahoo.fr

Remerciement.

Je tiens à remercier le Professeur E.Hanebaly pour ses remarques sur ce travail.